



Consentimento Esclarecido **Implantologia oral**

Os implantes dentários são peças em titânio que servem para substituir dentes perdidos sendo considerados a melhor opção do ponto de vista funcional e estético.

Procedimento

Na maioria das situações, a colocação de implantes dentários tem duas fases cirúrgicas e uma protodôntica. As fases cirúrgicas incluem uma primeira, a cirurgia de colocação do implante propriamente dita e uma segunda, a sua exposição caso o implante fique tapado por gengiva durante o tempo de cicatrização.

Simultaneamente ou previamente às fases cirúrgicas podem ser necessários procedimentos de regeneração óssea ou de tecidos moles (gengiva). Apesar das taxas de sucesso dos implantes dentários serem altas, cerca de 98% no doente não fumador e de 80% no doente fumador, o implante pode não osteointegrar, tendo indicação para ser removido.

A fase protodôntica inclui várias consultas para que o resultado da reabilitação seja otimizado.

Condicionantes ao sucesso dos implantes

Existem certas condições que podem limitar o sucesso dos implantes, nomeadamente:

- Hábitos parafuncionais (bruxismo);
- Hábitos tabágicos;
- Doenças sistémicas como a Diabetes Mellitus e o uso de alguma medicação.

● Contactos